



پانزدهمین همایش ملی برنج کشور

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری - پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان

۱-۲ اسفند ۱۳۹۱

(محرور جالش های تولید پایدار)

بررسی هم زیستی و ردیابی قارچ اندومیکوریز *Piriformos poraindica* در گیاه برنج

سید حسین موسوی^{۱*}، ولی اله بابایی زاد^۲، بهرام شریف نبی^۱، سید محمد علوی^۳، محمد علی تاجیک قنبری^۲ و امیر مساح^۱

۱. گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

۲. گروه گیاهپزشکی دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

۳. پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان.

*shm.musavi@gmail.com

چکیده

قارچ اندومیکوریز *Piriformos poraindica* از راسته Sebacinales، رده Hymenomycetes و شاخه بازیدیومیکوتا می باشد و روی ریشه تعدادی از گیاهان تیره Poaceae، Brassicaceae، Chenopodiaceae و Solanaceae گزارش شده است. بررسی های متعددی نشان داد که این قارچ موجب افزایش طول ریشه و اندام هوایی گیاه، افزایش جذب برخی عناصر غذایی، تحمل بیشتر گیاه به تنش های خشکی و شوری و القاء مقاومت سیستمیک علیه عوامل بیمارگر می شود. در این مطالعه ریشه گیاهچه های ۴ روزه در سوسپانسیون 10^6ml^{-1} کلأمیدوسپور قارچ غوطه ور و به مدت ۵ ساعت در دمای محیط با دور ۴۰ rpm تکان داده شد. گیاهچه ها در ظروف حاوی محیط آبی یوشیدا جهت رشد تا زمان نشاء قرار گرفتند. حضور قارچ در بافت کورتکس ریشه و برقراری همزیستی، با رنگ آمیزی ریشه و روش مولکولی بررسی شد. با رنگ آمیزی ریشه کلأمیدوسپورهای قارچ در بافت کورتکس ریشه به صورت گرد تا گلابی شکل و زنجیره ای مشاهده شد. با استخراج DNA و انجام PCR با آغازگر اختصاصی Tef (accession no. AJ249911) باندی معادل ۱۶۰ جفت باز مربوط به *P. indica* مشاهده شد. نتایج این بررسی نشان داد که هر دو روش ردیابی قارچ در گیاهان تیمار شده کارایی داشته ولی استفاده از تکنیک مولکولی دقیق و مطمئن تر است.

کلمات کلیدی: اندومیکوریز، برنج، ردیابی، کلأمیدوسپور، هم زیستی

مقدمه

برنج محصول عمده غذایی برای حدود نیمی از جمعیت دنیا می باشد که در بیش از ۱۱۰ کشور جهان کشت می گردد. این گیاه زراعی در ایران بعد از گندم در درجه دوم اهمیت قرار دارد (امانزاده و همکاران، ۱۳۸۵). این گیاه متعلق به جنس *Oryza* از رده گیاهان تک لپه ای و خانواده غلات است. تعدادی از میکروارگانیسم ها در ریشه برخی گیاهان به صورت اندوفیت موجب اثرات مفیدی در رشد و سلامتی گیاهان می شوند (کوزل و همکاران، ۲۰۰۶). قارچ های میکوریز از مهمترین میکروارگانیسم های خاک محسوب می شوند که با ایجاد تغییرات ژنتیکی، فیزیولوژیکی و اکولوژیکی در گیاهان میزبان خود، عملکرد آن ها را در واحد سطح افزایش می دهند. قارچ میکوریزای *Piriformos poraindica* روی ریشه تعداد زیادی از گیاهان هم چون گیاهان تیره Poaceae، Brassicaceae، Chenopodiaceae و Solanaceae گزارش شده است (شفر و همکاران، ۲۰۰۷ و ورما و همکاران، ۱۹۹۹). قارچ اندومیکوریز *P. indica* متعلق به گروه قارچ های میکوریز در راسته سباسینالس، رده هیمنومیست و شاخه بازیدیومیکوتا می باشد (ورما و همکاران، ۱۹۹۹). این قارچ موجب افزایش طول ریشه جهت جذب بهتر آب در گیاهان بیابانی، جذب برخی از عناصر غذایی مانند فسفر، کمک به رشد رویشی گیاه، تحریک گیاه در تولید هورمون های رشدی، تحمل بیشتر گیاه به



پانزدهمین همایش ملی برنج کشور

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری - پژوهشکده زنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان

۱-۱۳۹۱ اسفند

(معمور چالش های تولید پایدار)

استرس های خشکی و شوری و حفاظت گیاه در برابر عوامل بیماریزای گیاهی می گردد و به عنوان یک اندوفیت محرک رشد معرفی شده است. این قارچ همچنین موجب تحریک مقاومت سیستمیک علیه عوامل بیماریزای ریشه، ساقه و برگ در گیاه شده که این حفاظت سیستمیک گیاه منجر به افزایش عملکرد می شود (شفر و همکاران، ۲۰۰۷ و کوژل و همکاران، ۲۰۰۶). بررسی ها نشان داد که در ریشه های جو کلونیزه به *P. indica* بیان ژن های در گیر در متابولیسم هورمون های گیاهی عمدتاً جیبرلین، اکسین و آبسزیزیک اسید افزایش پیدا کرده است (شفر و همکاران، ۲۰۰۹).

مواد و روش ها

تهیه و تکثیر قارچ اندومیکوریز: در این بررسی جدایه قارچ *P. indica* (اهدایی پروفیسور کوژل، رئیس موسسه بیماری شناسی و جانور شناسی کاربردی دانشگاه گیزن آلمان) در محیط کشت جامد اختصاصی (CM) Complex Medium (CM) به مدت یک ماه در دمای ۲۷°C انکوبه شد. برای تهیه مایه تلقیح از آب مقطر استریل به همراه Tween20 به میزان ۰/۰۵ در صد استفاده شد.

کشت گیاه بذور: ارقام طارم محلی از گروه اصلاح بذر موسسه تحقیقات برنج کشور تهیه شد. با جوانه زدن بذور گیاهچه ها در تشت های حاوی محیط آبی یوشیدا انتقال یافت تا کلونیزه شدن قارچ در ریشه برنج مورد ارزیابی قرار بگیرد همچنین تعدادی از گیاهچه ها در گلدان ها نشاء شدند تا در طول دوره رویشی و زایشی پایداری و حضور قارچ در ریشه در شرایط خاکی مورد بررسی قرار بگیرد.

کلونیزه کردن گیاه با قارچ اندومیکوریز: ریشه گیاهچه های ۴ روزه در سوسپانسیون 10^6 ml^{-1} کلامیدوسپور قارچ *P. indica* غوطه ور کرده و به مدت ۵ ساعت روی شیکر در این حالت قرار گرفت. گیاهچه ها در تشت هایی که حاوی محیط آبی یوشیدا بود انتقال یافت.

بررسی همزیستی ریشه: به دو صورت میکروسکوپی و مولکولی انجام گرفت در بررسی میکروسکوپی ابتدا ریشه گیاهان تلقیح شده و شاهد رنگ آمیزی و سپس زیر میکروسکوب مورد ارزیابی قرار گرفت. رنگ آمیزی ریشه گیاه بر اساس روش ویریلیگ و همکاران با اندک تغییر استفاده شد (ویریلیگ و همکاران، ۱۹۹۸). جهت بررسی کلونیزه شدن قارچ در ریشه گیاه در سه مرحله رنگ آمیزی ریشه انجام پذیرفت ابتدا از گیاهچه های موجود در محیط آبی یوشیدا که پس از ۱۵ روز بعد از تلقیح میکوریز بوده، رنگ آمیزی دوم بعد از دو هفته پس از نشاء گیاهچه ها و رنگ آمیزی سوم در پایان خوشه دهی انجام پذیرفت تا حضور کلامیدوسپور و هیف قارچ در ریشه مورد ارزیابی قرار گیرد.


در بررسی مولکولی پس از ضد عفونی سطحی ریشه های تیمار شده و شاهد، استخراج DNA به روش موریس و تامسون انجام شد. برای ردیابی قارچ میکوریز از روش واکنش زنجیره ای پلیمرز با آغازگر اختصاصی Tef (accession no. AJ249911) استفاده شد. برای بررسی کمیت و کیفیت محصول بدست آمده الکتروفورز با ژل آگارز ۱/۵ در صد انجام شد.

نتایج و بحث


وضعیت همزیستی ریشه: با رنگ آمیزی از ریشه به روش ویریلیگ و همکاران در هر سه مرحله کلامیدوسپورهای قارچ در بافت کورتکس ریشه گیاهان تلقیح شده به صورت گرد تا گلابی شکل و زنجیره ای مشاهده شد (شکل ۱) توده های



هیف قارچ نیز در سطح ریشه قابل مشاهده بود در صورتی که در ریشه‌های شاهد کلامیدوسپورها و توده‌های هیف مشاهده نشد. همچنین در بررسی مولکولی با آغازگر اختصاصی Tef باندی معادل ۱۶۰ جفت باز مربوط به *P.indica* در نمونه‌های تلقیح شده مشاهده شد و در نمونه‌های شاهد باندی قابل رویت نبود (شکل ۲).



شکل ۱: کلامیدوسپورهای قارچ میکوریز *P. indica* در داخل بافت ریشه برنج.



شکل ۲: ارزیابی محصول PCR با ژل آگارز ۱.۵ در صد. چاهک ۱ و ۸ Lader، چاهک ۲ کنترل مثبت (استخراج مستقیم از قارچ)، چاهک ۳، ۴، ۵ و ۶ گیاهچه های تیمار شده با قارچ *P. indica* و چاهک ۷ کنترل منفی (گیاه شاهد).

نتایج بدست آمده از ردیابی قارچ در ریشه در طول دوره رشدی و پایان آن نشان می‌دهد که قارچ میکوریز *P.indica* توانسته ریشه برنج را کلونیزه کرده و در بافت کورتکس ریشه تکثیر بالایی را داشته باشد. نتایج این بررسی نشان داد که هر دو روش ردیابی قارچ در گیاهان تیمار شده کارایی داشته ولی استفاده از تکنیک مولکولی دقیق و مطمئن‌تر است. همچنین مقایسه وزن خشک ریشه و ساقه گیاه تیمار شده در مقایسه با گیاه شاهد افزایش معناداری داشت که این افزایش می‌تواند نمایانگر اثر همزیستی قارچ با گیاه باشد.



ردیابی قارچ *P. indica* در ریشه برنج در این بررسی با نتایج بررسی کوگل و همکاران (۲۰۰۶) و والر و همکاران (۲۰۰۵) در گیاه جو، شاهولاری و همکاران (۲۰۰۵) در آرابیدوپسیس و وارما و همکاران (۱۹۹۹) در ذرت مطابقت داشت.

منابع

۱. امانزاده م، مومنی ع، اخوت م، جوان نیکخواه م و خسروی و، ۱۳۸۵. مطالعه مقاومت ژنوتیپ‌های برنج (*Oryzasativa* L.) به بیماری بلاست در مرحله گیاهچه وخوشه در مازندران. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، جلد ۴۲. صفحه‌های ۲۰۹ تا ۲۱۹.
2. Kogel K H, Franken P, Huckelhoven R, 2006. Endophyte or parasite-what decides?. Curr. Opin. Plant Biology, 9 :358-363.
3. Schafer P, Khatabi B, Kogel K H, 2007. Root cell death and systemic effects of *Piriformosporaindica*: a study on mutualism. FEMS MicrobiolLett. 275:1-7.
4. Schafer P, Pfiffi S, Voll M, Zajic D, Chandler P M, Waller F, Scholz U, Kuhnemann J P, Sonnewald S, Sonnewald U, Kogel K H. 2009. Manipulation of plant innate immunity and gibberellin as factor of compatibility in the mutualistic association of barley roots with *Piriformosporaindica*, The Plant Journal, 59:461-474.
5. Shahollari B, Varma A, Oelmuller R, 2005. Expression of a receptor kinase in Arabidopsis roots is stimulated by the basidiomycete *Piriformosporaindica* and the protein accumulates in Triton X-100 insoluble plasma membrane microdomains. Journal. Plant Physiology. 162:945-958.
6. Varma A, Verma S, Sudha N, Butehorn B and Franken P, 1999. *Piriformosporaindica*, a cultivable plant growth-promoting root endophyte, Applied and Environmental Microbiology, 65:2741-2744.
7. Vierheilig H, Coughlan A P, Wyss U and Piche Y, 1998. Ink and vinegar, a simple staining technique for arbuscular-mycorrhizal fungi, Applied and Environmental Microbiology. 64: 5004-5007.
8. Waller F, Achatz B, Baltruschat H, Fodor J, Becker K, Fischer M, Heier T, Ckelhoven R H, Neumann C, Wettstein D, Franken P, Kogel K H, 2005. The endophytic fungus *Piriformosporaindica* reprograms barley to salt-stress tolerance, disease resistance, and higher yield. PNAS 102:13386-13391.